

保護者 様

富里市立葉山こども園長

出席停止について

こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが1日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、お子さんの健康回復状態がこども園での集団生活が可能な状態となつてからの登園であるようにご配慮ください。また、登園の目安は、登園の前日からお子さんの全身状況が良好であることが基準となります。

①医師による「意見書」が必要な感染症

	感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
	麻疹(はしか)	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
	風疹	発疹出現の前7日～後7日くらい	発疹が消失してから
	水痘(水ぼうそう)	発疹の出現1～2日前から痂皮形成まで	全ての発疹が痂皮化してから
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
	結核		医師により感染のおそれがないと認められるまで
	咽頭結膜炎(プール熱)	発熱・充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
	流行性角結膜炎	充血・目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから
	百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの
	急性出血性結膜炎	ウィルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数ヶ月排出される	医師により感染のおそれがないと認められるまで
	髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染のおそれがないと認められるまで

意 見 書

富里市立葉山こども園長 様

組 園児氏名

初診日 令和 年 月 日

診断名

令和 年 月 日から症状も快復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

医療機関

医師名

印またはサイン