

令和 4 年 1 月 7 日

成田空港記者会 各位

各 報 道 機 関 御中

新型コロナウイルス感染症に係る 「新型コロナワクチン追加（３回目）接種」のチラシの配布 について

新型コロナウイルス感染症に係る、「新型コロナワクチン追加（３回目）接種」についてのチラシを、別紙のとおり作成しました。

チラシはA 4 両面刷りで、令和 4 年 1 月 1 2 日（水）の新聞朝刊に折り込みます。

また、令和 4 年 1 月 1 1 日（火）に市内公共施設等に配架します。

健康福祉部健康推進課 担当： 藤田、池内

電 話： 0476-93-6493 FAX： 0476-93-2422

E-mail Kenkou@city.tomisato.lg.jp

【送信枚数： 3 枚】





新型コロナワクチン追加(3回目)接種

富里市では3回目接種の接種間隔を
原則8か月以上経過よりも短縮して開始します。

◎ 接種対象者

2回目の接種を終了し、接種を受ける日に富里市に住民票のある18歳以上の方

◎ 使用ワクチン

追加(3回目)接種では、ファイザー社又は武田/モデルナ社のワクチンのいずれかを接種することになります。なお、1・2回目接種ではファイザー社ワクチンが9割、武田/モデルナ社ワクチンが1割の実績でしたが、3回目接種の国からのワクチン配分ではおよそ5対5となりますので、御理解をお願いします。

◎ 接種スケジュールについて

富里市では令和4年1月14日(金)から、3回目接種クーポン券を順次発送します。クーポン券が届きましたら、予約が可能となります。

発送(順次)



令和4年1月14日(金)～

予約開始



クーポン券が届き次第

接種開始

個別接種
1/24(月)～



集団接種
2/6(日)～



2回目接種が完了した日を基準として、順番に3回目接種クーポン券を1週間ごとに発送しますので、到着までお待ちください。

※ワクチンの供給状況により発送時期が変更となる場合があります。

◎ 予約方法

1. インターネットによる24時間対応の予約システム

富里市新型コロナワクチン接種予約サイト



QRコード

2. 電話によるワクチン接種コールセンター

受付時間：8時30分から17時15分(土曜・日曜、祝日含む)

電話番号：0120-567-846(フリーダイヤル)

3. 市役所等に設置する「ワクチン接種予約特設窓口」

場所：富里市役所内及び北部コミュニティセンター

令和4年1月18日(火)から3月31日(木)まで(予定)

※3回目接種クーポン券を持参のうえ来庁してください。



<よくあるご質問>

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。
2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。
(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果が有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、御希望の方はお早めに受けてください。

<3回目接種の安全性と効果>

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

<1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果>

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されています。

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でもファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇します。



ワクチンの組み合わせ			抗体価
☆ → ☆ → ○ ファイザー ファイザー モデルナ			抗体価は 上昇
☆ → ☆ → ☆ ファイザー ファイザー ファイザー			

抗体価は
上昇

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

厚生労働省資料により作成しています。